Le Mélange de Bonain pour Anesthésie Locale de Contact

Dr. Ariane Cortesse.
Urologue
Hôpital des Diaconesses
Hôpital Saint-Louis
N° Adeli : 52 897 25

Mélange de BONAIN pour anesthésie locale de contact

- Chlorydrate de cocaïne : cinq grammes
- Phénol : cinq grammes
- Menthol : cinq grammes

Pour un volume final de 15 ml

Tél. Hôp. St Louis : 01 42 49 96 23
Tél. Hôp. des Diaconesses : 01 44 74 10 10

Mode d'Emploi

Appliquer le mélange à l'aide d'un écouvillon stérile sur la partie à anesthésier une dizaine de minutes avant d'inciser. On note alors un blanchiment muqueux dû à la vasoconstriction provoquée par la cocaïne ■

Commentaire

Ce mélange peut être obtenu sur commande de toute officine pharmaceutique sur une ordonance sécurisée portant votre numéro Adeli. Le mélange de Bonain est un anesthésique de contact que j'utilise pour les plasties du frein, les méatoplasties chez la femme et les sections de brides hyménéales.
Par rapport à d'autres types d'anesthésiques locaux, Xylocaine notamment, le mélange de Bonain est appliqué de façon indolore, sans injection, et n'entraîne pas d'infiltration des tissus.
La cocaïne a un effet anesthésiant, le phénol cautérisant et le menthol odoriférant. Ce type d'anesthésie de contact était largement utilisé en ORL pour les anesthésies du nez et du tympan. Son abandon en ORL est lié à la survenue de quelques malaises en utilisation endonasale, et à de rares nécroses tympaniques. Il rend encore de grands services dans nombreuses indications pour les petits gestes de sections muqueuses en urologie ■